

تولفین

محلول تزریقی

ترکیبات :

تولفن‌امیک اسید	۰/۰۴۰۰ گرم
بنزیل الکل (E1519)	۰/۰۱۰۴ گرم
سدیم هیدروکسی متان سولفینات	۰/۰۰۵۰ گرم
مواد جانبی	۱ میل لیتر

موارد مصرف :

در گاو : کاهش التهاب همراه با عفونت های تنفسی و اسکلتی – عضلانی

موارد منع مصرف :

استفاده از این دارو در موارد نارسایی های قلبی ، کبدی و کلیوی توصیه نمی شود

تولفن‌امیک اسید ، در زخم و یا خون ریزی های گوارشی منع مصرف دارد.

در موارد ازدیاد حساسیت به ماده موثره یا هر یک از مواد جانبی استفاده نشود.

عوارض جانبی :

التهاب و تورم گذرا ممکن است در محل تزریق ظاهر شود. در صورت بروز اثرات شدید یا هرگونه تأثیری که ذکر نشده است ، لطفاً به دامپزشک اطلاع دهید.

گونه هدف :

گاو

میزان و نحوه مصرف :

۲ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یا ۱ میلی لیتر به ازای هر ۲۰ کیلو وزن بدن بصورت داخل عضلانی تزریق شده و هر ۴۸ ساعت تکرار شود.

۲ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یا ۱ میلی لیتر به ازای هر ۲۰ کیلو وزن بدن بصورت داخل وریدی تزریق شده و هر ۲۴ ساعت تکرار شود و با ۲۴ ساعت بعد بصورت تزریق داخل عضلانی تکرار شود.

بیشتر از ۵ تزریق متوالی انجام نشود.

دوره پرهیز از مصرف :

تزریق داخل عضلانی : گوشت و لاشه : ۱۲ روز ، شیر : ۰

تزریق داخل وریدی : گوشت و لاشه : ۴ روز ، شیر : ۱۲ ساعت

احتیاط های ویژه نگهداری :

بعد از باز کردن : ۲۸ روز

دور از نور و دور از دید و دسترس کودکان قرار گیرد و زیر ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود

هشدار های ویژه :

هشدار ویژه برای حیوان هدف :

بیشتر از ۲۰ میلی لیتر در هر محل تزریق نشود.

هشدار ویژه برای مصرف در حیوانات :

اقدامات احتیاطی ضد عفونی را در زمان تزریق دارو انجام دهید.

برای حیواناتی که دهیدراته اند یا مبتلا به افزایش یا کاهش فشار خون هستند (خطر بالقوه افزایش مسمومیت کلیوی را دارند) استفاده نشود.

از تجویز همزمان دارو هایی که بالقوه نفروتوکسیک هستند خودداری شود

هشدار های ویژه برای شخصی که دارو را به دام تزریق می کند

در صورت تماس با چشم یا پوست ، فوراً با آب بشویید.

استفاده حین آبستنی یا شیرواری

بی خطر بودن دارو در طول آبستنی اثبات نشده است.

فقط بر اساس ارزیابی سود / خطر دامپزشک مسئول مصرف شود

واکنش با دیگر دارو ها یا سایر واکنش ها

سایر ضد التهاب های غیر استروئیدی بطور همزمان یا طی ۲۴ ساعت از مصرف هر کدام ، تجویز نشوند. تولفنامیک اسید شدیداً به پروتئین

های پلاسما متصل می شود و می تواند با دیگر دارو های شدیداً متصل شونده رقابت کند

در دز های بالا ، اختلالات عصبی گذرا در گاو های ماده مشاهده شده است.

هر گونه داروی مصرف نشده یا مواد زائد ناشی از مصرف چنین دارو هایی باید مطابق با قوانین محلی معدوم گردد.

عرضه :

ویال های ۱۰ ، ۲۵ ، ۳۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۲۵۰ میلی لیتری

تمام سایز های بسته بندی ممکن است در بازار موجود نباشد

با مجوز سازمان دامپزشکی کشور

فقط برای مصرف دامپزشکی

وارد کننده و نماینده انحصاری : شرکت خدمات کشاورزی هفشجان