

سلفرول

امولسیون تزریقی

سلنیوم - ویتامین E

ترکیبات

سلنیوم (بصورت ملح سلنیت سدیم) ۰/۰۲۳ گرم
ویتامین E (بصورت ملح استات) ۳/۸۲۰ گرم
اسید سوربیک ۰/۰۵۰ گرم
متیل پاراهیدروکسی بنزوات (E218) ۰/۱۰ گرم
پروپیل پاراهیدروکسی بنزوات (E216) ۰/۰۲ گرم
مواد جانبی (شامل ویتامین B12) تا ۱۰۰ میلی لیتر

شکل ارائه :

ویال ۱۰۰ میلی لیتری

خصوصیات :

خصوصیات فارماکولوژیکی

گروه درمان دارویی: متابولیسم و دستگاه گوارش، ترکیبات سلنیوم.

موارد مصرف

در کره اسب ها، گوساله ها، بره ها، پیشگیری و درمان کمبودهای ویتامین E و سلنیوم:

- میوپاتی ها
- دیستروفی های عضلانی

موارد منع مصرف

در موارد حساسیت شناخته شده به ماده موثره یا هر یک از مواد جانبی، استفاده نگردد.
برای اسب های بالغ تجویز نشود

میزان و نحوه مصرف

روش داخل عضلانی عمیق

پیشگیری:

گوساله ها، کره اسب ها: ۱/۵ میلی لیتر به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن تا ۱۰۰ کیلوگرم، ۱ میلی لیتر به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن وقتی وزن حیوان بالای ۱۰۰ کیلوگرم است (به هشدارهای ویژه در زیر مراجعه کنید).
بره ها: ۰/۲ میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
درمان: مصرف به همان میزان که در بالا ذکر شد، تکرار تزریق در فواصل ۲ یا ۳ هفته در صورت لزوم.
قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود.

هشدارهای ویژه

هشدارهای ویژه برای مصرف در حیوانات

بدلیل مسمومیت سلنیوم، دزها و تاخیرهای ذکر شده در بخش "میزان و نحوه مصرف" باید رعایت شوند. تزریقات باید تحت ضدعفونی دقیق انجام گیرد.

هشدارهای ویژه برای شخصی که داروی دامپزشکی را به حیوانات تزریق میکند

در صورت تزریق تصارفی به خود، فوراً با پزشک مشورت کرده و برگه راهنمای دارو را به او نشان دهید.

مصرف حین آبستنی و شیرواری

ایمنی این دارو در طول آبستنی ارزیابی نشده است. با این حال، مصرف آن در طول آبستنی بعنوان یک مشکل خاص مطرح نیست.

واکنش با دیگر داروها و سایر اشکال واکنش

واکنشی شناخته نشده است

مصرف بیش از حد

مصرف بیش از حد سلنیوم ممکن است نبض ضعیف و سریع، تنگی نفس، کولیک، پر ادراری، سیانوز، ناتوانی، افسردگی و عدم تعادل را القا کند. در موارد مصرف بیش از حد، درمان علامتی همراه با مایع درمانی صحیح انجام شود (تزریق یا نوشاندن در صورت اشتها)

واکنش های جانبی

واکنش التهابی در محل تزریق ممکن است در موارد بسیار نادر اتفاق بیفتد. واکنش هایی مثل شوک آنافیلاکتیک با اختلالات قلبی - عروقی، ناتوانی، کمایی که احتمالاً منجر به مرگ حیوان شود، نیز در موارد بسیار نادر مشاهده شده اند.

دوره پرهیز از مصرف

گوشت و لاشه: ۴ روز

پیش آگهی های اختصاصی نگهداری

عمر قفسه ای بعد از بازکردن ظرف: ۲۸ روز

دور از دسترس و دید کودکان نگهداری شود.

موارد احتیاط ویژه برای دفع محصولات مصرف نشده یا مواد زاید

هرگونه داروی مصرف نشده و ظروف خالی مطابق با قوانین محلی دور ریخته شوند

فقط با نسخه دامپزشکی عرضه شود

با مجوز سازمان دامپزشکی کشور