

سپتوتریل  
محلول تزریقی  
آنتی بیوتیک

### ترکیبات

۴ گرم	تریمتوپریم
۲۰ گرم	سولفا متوکسی پیریدازین
۱ میلی لیتر	بنزیل الکل
۱۰۰ میلی لیتر	مواد جانبی

### ارائه:

ویال ۱۰۰ میلی لیتری - ویال ۲۵۰ میلی لیتری

### گونه های هدف:

گاو، گوساله، گوسفند، بره  
تزریق زیرجلدی، داخل عضلانی و درون وریدی آهسته

### موارد مصرف

عفونتهای حساس به ترکیب تریمتوپریم و سولفامتوکسی پیریدازین در گاو، گوساله، گوسفند و بره.  
درمان عفونتهای تنفسی، گوارشی و ادراری ناشی از باکتریهای حساس به سولفامتوکسی پیریدازین و تریمتوپریم.

### میزان مصرف

#### گاو - گوسفند:

تزریق زیرجلدی، داخل عضلانی و درون وریدی آهسته  
۱۳/۴ میلی گرم سولفامتوکسی پیریدازین و ۲/۷ میلی گرم تریمتوپریم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر روز به روش داخل عضلانی و درون وریدی آهسته، مثال: ۱ میلی لیتر به ازای ۱۵ کیلوگرم وزن بدن.  
در گاو:

- گوساله ۶۰ کیلویی: ۴ میلی لیتر
- بالغین: ۳۰ میلی لیتر

در گوسفند:

- بره ها: ۰/۱ میلی لیتر به ازای ۱/۵ کیلوگرم وزن بدن
- بالغین: ۴ میلی لیتر

### موارد منع مصرف

در این موارد مصرف نشود: حیوانات با نارسایی شدید کبدی یا کلیوی  
دهیدراتاسیون  
آبستنی  
تازه متولدشده  
در صورت حساسیت به هر یک از مواد موثره یا جانبی  
برای اسبها استفاده نشود

## عوارض جانبی

در صورت طولانی شدن درمان، ممکن است سنتز هورمون های تیروئیدی مهار شود.

## پیش آگهی های ویژه برای مصرف

سپتوتریل را با سایر داروها در یک سرنگ مخلوط نکنید.  
به آرامی و بدون مخلوط شدن با خون در سرنگ حاوی سپتوتریل، تزریق گردد.

## شرایط نگهداری

عمر قفسه ای بعد از باز شدن: ۲۸ روز. در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.  
دور از دسترس و دید کودکان قرار گیرد.

## دوره پرهیز از مصرف

گوشت و لاشه: ۱۲ روز  
شیر: ۶ روز (۱۲ دوشش)

## موارد احتیاط ویژه برای دفع داروی دامپزشکی مصرف نشده یا مواد زاید ناشی از استفاده چنین محصولاتی

هرگونه داروی دامپزشکی مصرف نشده یا مواد زاید ناشی از چنین دارویی باید مطابق با قوانین محلی دور ریخته شوند.  
دارو تنها با نسخه داده شود  
بیش از حد مصرف نگردد

**تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور**

**فقط برای مصرف دامپزشکی**