

Metacam

ضدالتهاب غیراستروئیدی

دسته دارویی

ضدالتهاب غیراستروئیدی.

ترکیبات

ملوکسیکام ۲۰mg/ml

گونه هدف

گاو.

موارد مصرف

این دارو یک ضدالتهاب غیراستروئیدی در درمان عفونت های حاد تنفسی است که به همراه آنتی بیوتیک اختصاصی جهت کاهش علائم بالینی در گاو به کار می رود.

در درمان اسهال به همراه مایع درمانی (خوراکی) به منظور کاهش علائم بالینی در گوساله ها، گاوهای ماده جوان و گاوهای غیر شیرده (تلیسه)، به عنوان درمان کمکی در درمان ورم پستان حاد همراه با درمان آنتی بیوتیکی.

مقدار و روش مصرف

تزریق تک دزی زیر جلدی یا داخل وریدی به میزان ۰/۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم (مثلاً ۲/۵ میلی لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلو وزن بدن)، همراه با درمان آنتی بیوتیکی یا مایع درمانی خوراکی.

موارد احتیاط

از مصرف دارو در موارد دهیدراسیون شدید و نیز در حیوانات مبتلا به شوک هایپوولمیک و یا فشار خون بسیار پایین که به مایعات تزریقی نیز احتیاج دارند به علت احتمال خطر افزایش مسمومیت کلیوی پرهیز شود.

موارد منع مصرف

در حیواناتی که دارای اختلال در عملکرد کبد، قلب، کلیه، اختلالات هموراژیک و یا مکان هایی که شواهدی از وجود ضایعات خونریزی دهنده در دستگاه گوارش وجود دارد، مصرف نگردد.

عوارض جانبی

در تزریق زیرجلدی یا داخل عضلانی، ممکن است یک تورم گذرا در ناحیه تزریق اتفاق بیفتد که به خودی خود برطرف می شود.

همراه با گلوکوکورتیکواستروئیدها و دیگر داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی و عوامل ضدانعقادی مصرف نگردد.

در صورت استفاده از دز بالا، درمان علامتی باید آغاز گردد.

زمان پرهیز از مصرف

گوشت و لاشه: ۱۵ روز. شیر: ۵ روز.

شرایط نگهداری

در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
عمر قفسه ای بعد از باز شدن درب دارو، ۲۸ روز می باشد.

بسته بندی

ویال ۲۰ و ۵۰ میلی لیتری.

ساخت

شرکت Labiana Life Science، اسپانیا.

دارنده مجوز فروش

شرکت Boehringer Ingelheim، آلمان.