

تراکلسیم

محلول تزریقی

کلسیم درمانی

ترکیبات :

کلسیم گلوکونات	۳۵ گرم
کلسیم گلوکوهیتونات	۱۰ گرم
متیل پاراهیدروکسی بنزوات (E218)	۱۰۰ میلی گرم
اسید بوریک (E284)	۸/۲ گرم
مواد جانبی	۱۰۰ میلی لیتر

شکل ارائه

ویال ۱۰۰ میلی لیتری

گونه های هدف

گاو ، گوسفند ، بره ، اسب ، کره اسب ، خرگوش ، سگ و گربه
تجویز داخل عضلانی ، درون وریدی و زیر جلدی آهسته

موارد مصرف

در گاو ، گوسفند ، اسب ، خرگوش ، سگ و گربه
پیشگیری و درمان هیپوکلسیمی مثل تب شیر ، فلجی زایمان ، کزاز علفی ، تشنج آبستنی

پوسولوژی ، روش و طریقه مصرف

روش مصرف : تزریق درون وریدی آهسته ، تزریق داخل عضلانی و زیر جلدی
در صورت لزوم ، تجویز می تواند هر ۱۲ ساعت برای یک تا دو روز تکرار شود.

موارد منع مصرف

در حیوانات با اختلالات قلبی مصرف نشود.

واکنش های جانبی

در طول تجویز داخل عضلانی یا زیر جلدی ، واکنش های بافتی موضعی در محل تزریق ممکن است دیده شوند.

تجویز داخل وریدی بسیار سریع می تواند موجب آریتمی قلبی و کلاپس کشنده گردد.

علائم هایپر کلسیمی می تواند در طول ۱۰ دقیقه بعد از تجویز اتفاق بیفتد (تومور ها ، برانگیختگی ، عرق کردن ، هیپوتونی و کلاپس)

هشدار های ویژه

هشدار های ویژه برای گونه های هدف :

ندارد

پیش آگهی های ویژه جهت مصرف در حیوانات

محلول باید قبل از مصرف به درجه حرارت بدن برسد. تجویز داخل وریدی باید بصورت یک تزریق آهسته باشد و در صورت بروز عوارض جانبی بلافاصله متوقف گردد.

در طول تجویز داخل عضلانی یا زیر جلدی ، دز مصرفی در چند ناحیه تزریق شود تا واکنش های موضعی محدود گردد.

در مصرف و استفاده مجدد سود/خطر این دارو باید بسته به درمان های احتمالی قبلی ، مخصوصا درمان های با پایه کلسیم ارزیابی شود.

پیش آگهی های ویژه جهت فردی که محصول دامپزشکی را برای حیوانات به کار می برد

مصرف در طول آبستنی یا شیرواری

ایمنی دارو در گونه های هدف در طول آبستنی و شیرواری ارزیابی نشده است. با این حال مصرف این محصول دارویی در طول آبستنی و شیرواری بعنوان یک مشکل خاص مطرح نیست.

واکنش ها

شناخته نشده است

مصرف بیش از حد

به بخش واکنش های جانبی مراجعه کنید

ناسازگاری ها

سازگاری با دیگر دارو ها باید قبل از ترکیب بررسی شود تا از تشکیل رسوب جلوگیری شود.

شرایط نگهداری

عمر قفسه ای بعد از باز کردن بسته بندی اصلی : ۲۸ روز

در دمای زیر ۲۵ درجه نگهداری شود

دور از دسترس کودکان نگهداری شود

دوره پرهیز از مصرف

گوشت و لاشه : صفر

شیر : صفر

موارد احتیاط ویژه برای دفع داروی دامپزشکی مصرف نشده یا مواد زاید ناشی از استفاده چنین محصولاتی

هرگونه داروی دامپزشکی مصرف نشده یا مواد زاید ناشی از چنین دارویی باید مطابق با قوانین محلی دور ریخته شوند.