

Ubrostar

پماد پستانی دوره خشکی (DC)

دسته دارویی

آنتی بیوتیک داخل پستانی.

ترکیبات

هر سرنگ داخل پستانی ۴/۵ گرمی (۵ میلی لیتری) حاوی:

پنتامات هیدرید ۱۰۰ میلی گرم

فرامایستین سولفات ۱۰۰ میلی گرم

پنی سیلین بتامین ۲۸۰ میلی گرم

گونه هدف

گاو (گاوه‌های شیری در دوره خشکی).

مکانیسم عمل

Penicillin و Penethamate آنتی بیوتیک‌های بتالاکتام هستند که سنتز دیواره سلولی باکتری را از طریق مهار واکنش ترنس پپتیداسیون که برای تشکیل یک دیواره سلولی مستحکم لازم می‌باشد، مختل کرده و تمامیت دیواره سلولی باکتری را از بین برده و باعث متلاشی شدن باکتری می‌شود.

Framycetin یک آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزیدی باکتریوسید می‌باشد که با ایجاد اختلال در اعمال ریبوزوم باکتری‌ها، سنتز پروتئین‌های باکتری و نفوذپذیری غشای سلولی موجب مرگ باکتری می‌شود.

مقدار و روش مصرف

قبل از استفاده، شیر گاو برای آخرین بار دوشیده شود و پس از تمیزکردن و ضدعفونی کردن سرپستانک‌ها، یک سرنگ برای هر کارتیبه استفاده شود و پس از تزریق در داخل پستان، کارتیبه به آرامی ماساژ داده شود تا آنتی بیوتیک در آن پخش شود.

زمان پرهیز از مصرف

گوشت و لاشه: ۱۰ روز.
شیر: درمان ۳۵ روز قبل از زایمان: تا ۳۶ ساعت پس از زایمان.
درمان کمتر از ۳۵ روز مانده به زایمان: تا ۳۷ روز پس از درمان.

شرایط نگهداری

در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.

بسته بندی

۲۰ عدد سرنگ داخل پستانی ۵ میلی لیتری.

ساخت

شرکت Lohman Pharma Herstellung GmbH، آلمان.

دارنده مجوز فروش

شرکت Boehringer Ingelheim، آلمان.